


学校感染症とその出席停止期間

(別紙)

分類	感染症の種類	出席停止の期間の基準
第1種	<ul style="list-style-type: none"> ・エボラ出血熱・クリミア・コンゴ出血熱・痘そう・南米出血熱・ペスト・マールブルグ病・ラッサ熱・急性灰白髄炎・ジフテリア・重症急性呼吸器症候群・中東呼吸器症候群・特定鳥インフルエンザ 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 治癒するまで
第2種	<ul style="list-style-type: none"> ・ インフルエンザ（特定鳥インフルエンザを除く。） ・ 百日咳 ・ 麻疹（はしか） ・ 流行性耳下腺炎（おたふくかぜ） ・ 風しん（三日はしか） ・ 水痘（水ぼうそう） ・ 咽頭結膜熱（プール熱） ・ 結核、髄膜炎菌性髄膜炎 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日（幼児にあっては3日）を経過するまで ・ 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで ・ 解熱した後3日を経過するまで ・ 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで ・ 発しんが消失するまで ・ すべての発しんが痂皮化するまで ・ 主要症状が消退した後2日を経過するまで ・ 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
<p>※ただし、結核、髄膜炎菌性髄膜炎を除く第2種の感染症については、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるときは、この限りではありません。</p>		
第3種	<ul style="list-style-type: none"> ・ コレラ・細菌性赤痢・腸管出血性大腸菌感染症・腸チフス・パラチフス・流行性角結膜炎・急性出血性結膜炎 ・ その他の感染症 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで

[参考] インフルエンザにおいては、最短でも、発症後6日目からの登校になります。



Infección escolar y periodo de inasistencia por caso de enfermedades

スペイン語

(Adjunto)

Clasificación	Tipos de infecciones	Criterios para el período de suspensión
1er tipo	<ul style="list-style-type: none"> • Fiebre del Ébola • Crimea • Fiebre hemorrágica del Congo • viruela • Fiebre hemorrágica sudamericana • Peste • Enfermedad de Marburgo • Fiebre de Lassa • Poliomieltis aguda • Diphtheria • Síndrome respiratorio agudo severo • Síndrome respiratorio de Oriente Medio • Influenza aviar específica 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasta que sane por completo
2do tipo	<ul style="list-style-type: none"> • Influenza (excluido la influenza aviar específica) • Tos ferina • Sarampión • Parotiditis • Rubéola • Varicela • Conjuntivitis • Tuberculosis, Meningitis meningocócica 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 días después de la aparición de los síntomas y hasta 2 días (3 días para los bebés) después que le baje la fiebre • Hasta que desaparezca la tos específica o hasta que termine el tratamiento adecuado de la sustancia antimicrobiana durante 5 días • Hasta 3 días después que le baje la fiebre • 5 días después de la hinchazón que se desarrollaro en la parótida, la glándula submandibular o la glándula sublingual y hasta que la condición general mejoró • Hasta que desaparezca la rubéola. • Hasta que todos los émbolos tengan costra. • Hasta que pasen 2 días después de que los síntomas principales desaparezcan • Hasta que el médico de la escuela u otros doctores reconozcan que no hay peligro de infección a debido de la condición médica <p>※Sin embargo, no es aplicado a las infecciones de 2do tipo que el médico de la escuela u otros doctores reconozcan que no hay peligro de infección a debido de la condición médica excluyendo tuberculosis y meningitis meningocócica</p>
3er tipo	<ul style="list-style-type: none"> • Colera • Disentería bacteriana • Infección hemorrágica intestinal de E. coli • Fiebre tifoidea • Paratifoide • Queratoconjuntitis epidémica • Conjuntivitis hemorrágica aguda • Otras enfermedades infecciosas 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasta que el médico de la escuela u otros doctores reconozcan que no hay peligro de infección a debido de la condición médica

[Referencia] En caso de influenza, la asistencia será minimo a partir del sexto día después del contagio.

